

Césarienne chez les carnivores

D'après le cours de M. Benazzouz

© B.A & Kusanagi 2011-2012

HTTP : //VETO-CONSTANTINE .COM

1. temps préopératoire :

- Tente et rasage de la peau de la région ventrale sans irritations en savonnant.
- Perfusion systématique par un abord veineux (veine sous-cutanée antérieure ou veine saphène interne) au cas où il y aurait une hémorragie.
- Prémédication : administrer des tranquillisants (calmivet, vet tranquille) de l'atropine (organe innervé).
- Vidange vésicale par taxis trans abdominale sinon sonder dans une salle annexe.
- Contention : décubitus dorsal.
- Anesthésie : Thiopental (Nesdonal ND) et si possible avec une anesthésie locale par Fluothane + NO₂, O₂ (c'est l'idéal) + perfusion.
- Asepsie du matériel.
- Choix du fil en fonction de la taille de l'animal, l'animal gras nécessite un fil dur.
- Gants, champs sont stériles.

2. Techniques opératoires :

- Incision de l'ombilic jusqu'aux mamelles inguinales.
- Incision de la paroi abdominale par la ligne blanche (laparotomie).
- Extérioriser prudemment les cornes gravides, et les protéger avec deux champs stériles, de même, on protège les anses intestinales par compresses humectées de sérum et de pénicilline en solution.
- On repère la corne utérine, puis au niveau de sa grande courbure on incise sur une zone de moindre vascularisation.
- Extérioriser le fœtus avec les enveloppes placentaires en totalité par la même brèche, en faisant progresser fœtus par fœtus. Puis on passe à la deuxième corne.
- Injection traçante d'Ocytocine pour l'involution utérine, elle se fait tout autour de la brèche en gouttes.
- On termine par suture de l'utérus par deux surjets non perforants enfouissant.
- On remet en place les organes dans la cavité abdominale.
- Il ne faut pas oublier une antibio-prévention avec antiseptiques avant de refermer les muscles avec le péritoine en points X (ERCEDEX) avec un fil épais (3.5).
- Puis on fait un surjet sous-cutané.
- Au bout de 8 à 10 jours on retire les fils de suture.